

DIATER
ESPAÑA

 **allergika**
chile

**INMUNOTERAPIA
SUBLINGUAL
Diater Spray Maxi**

- Instrucciones de uso.
- Conocimientos generales.
- Datos prácticos.

DIATER
ESPAÑA

 **allergika**
chile



Badajoz 130, Of. 1404, Las Condes, Santiago, Chile. Tel: 562 2233 7390

Diater Sublingual Spray Maxi



Es un tratamiento específico que se utiliza para tratar las enfermedades alérgicas de tipo respiratorio (rinitis, conjuntivitis y asma bronquial) y para algunas alergias a alimentos o alergia al látex. Es un tratamiento capaz de mejorar o eliminar los síntomas causados por la exposición a los alérgenos responsables de los síntomas del paciente.

Al procedimiento se le conoce como inmunoterapia.

Las medidas de evitación y el tratamiento sintomático (medicamentos) son complementarios a la administración de la inmunoterapia oral, por lo que el paciente no debe suspenderlos o modificarlos hasta que su médico especialista le dé indicaciones precisas al respecto.

La inmunoterapia sublingual spray de forma general se administrará en el domicilio del paciente, aunque en algunos casos las dosis de inicio se pueden administrar en su centro de salud, junto con su médico. Su médico le indicará la dosis y la pauta a seguir.

Descripción

Es un tratamiento constituido por extractos alérgicos a los que está sensibilizado el paciente, de administración sublingual. Este tratamiento se ha preparado en los Laboratorios Diater en España, en forma individualizada según prescripción del médico tratante. Se presenta en frascos de vidrio, sellados identificados con una letra y un color. Contienen el o los alérgenos según receta. Los demás componentes son solución salina glicerinada y fenolada.

Cómo usar Diater Sublingual Spray Maxi

Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por su médico. La pauta detallada es orientativa, pudiendo ser variada por su médico.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con Diater Sublingual Spray Maxi. No suspenda el tratamiento antes de lo indicado por su médico.

Instrucciones de uso

Debe aplicarse siempre a la misma hora, no debe mezclarse con comida y no se debe ingerir líquidos o alimentos al menos en los 15 minutos posteriores. Comenzar la administración del tratamiento por orden alfabético (C, D), que corresponde al de menor concentración. (en caso de pauta de inicio convencional).

Pasos

- Agitar el vial suavemente antes de cada administración.
- El vial debe estar en posición vertical, sin invertirse.
- Antes de administrar la primera dosis de cada frasco nuevo, se deben efectuar 3 ó 4 pulsaciones al aire, para llenar completamente el circuito y la válvula dosificadora.
- Presionar tantas veces como pulsaciones deban suministrarse, apuntando la boquilla debajo de la lengua.
- La dosis que su médico le indique la debe aplicar pulverizando el spray debajo de la lengua, y mantener durante 2 minutos. A continuación, tragar (a no ser que su médico le indique que debe escupirla).
- Las dosis se administran diariamente.




Diater Sublingual Spray Maxi

Consideraciones

- Es normal que en el vial C sobre algo de líquido ante la previsión de una posible repetición o modificación de la dosis por parte del médico.
- No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
- Si toma más Diater Sublingual Spray Maxi del que debiera, consulte a su médico inmediatamente.
- Para que el tratamiento sea efectivo es importante que Diater Sublingual Spray Maxi se use de manera regular durante la totalidad del período de tratamiento.
- Si interrumpe el tratamiento con Diater Sublingual Spray Maxi, informe a su médico inmediatamente.
- El médico determinará en cada caso la duración del tratamiento.

Conservación de Slit Spray

- Mantener este tratamiento fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Conservar en refrigerador (entre 2°C y 8°C). No congelar.
- Conservar siempre dentro del embalaje original.
- No utilice Diater Sublingual Spray Maxi después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- Si debe viajar puede llevarlo consigo en una cooler con un par de ice pack para mantener la temperatura baja. Estos productos se mantienen estables ante elevaciones temporales de la temperatura ambiente. Sin embargo, debe hacerse un esfuerzo por mantenerlos en su rango de T° el mayor tiempo posible.



Cuando suspender su inmunoterapia oral

Existen circunstancias en las que se debe suspender temporalmente la inmunoterapia. Estas son indicaciones generales y siempre cotéjelas con su médico.

- Infecciones orofaríngeas (hasta resolución de la infección).
- Cirugía oral (7 días).
- Extracción dental o caída de dientes (hasta cicatrización de la herida).
- Lesiones y/o inflamaciones orales (aftas bucales, úlceras bucales, gingivitis o periodontitis) (hasta resolución).
- Gastroenteritis aguda (hasta resolución).
- Siempre cuando esté con una situación de salud concomitante y que le merezca dudas consulte con su médico tratante.

¿Es posible que aparezca alguna reacción adversa tras la administración de la inmunoterapia?

La administración del producto es muy segura, pero no está totalmente exenta de reacciones, ya que durante el tratamiento se le administrarán por vía sublingual dosis del alérgeno que le provoca síntomas en su exposición natural.

La inmunoterapia sublingual es muy bien tolerada por la mayoría de los pacientes, pero en algunos casos pueden aparecer reacciones adversas. Estas reacciones pueden ser:

Reacciones locales.

Son frecuentes, pero generalmente muy leves. Aparecen adyacentes a la zona de la administración. Pueden aparecer de forma inmediata (30-60 min tras la administración) o de forma tardía (después de una hora). Suelen aparecer con la aplicación de las primeras dosis y remiten al continuar con el tratamiento.

Pueden ser:

Molestias en la mucosa oral (picor y/o hinchazón en mucosa oral o faríngea) (ver esquema A).

Molestias gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal) (ver esquema B).

Diater Sublingual Spray Maxi

contrario tomar un antihistamínico oral (desloratadina, levocetirizina, clorfenamina, etc.) ½ a 1 hora antes de administrarse la dosis. Esto mientras se mantengan los síntomas locales descritos. Adicionalmente durante las primeras dosis si hubiera síntomas gastrointestinales posterior a la aplicación, se recomienda no deglutirla y escupirla después de los dos minutos. (Ver esquema B)


ESQUEMA A

actuación si se presenta una reacción local orofaríngea:



ESQUEMA B

actuación si se presenta una reacción local gastrointestinal:



Reacciones sistémicas.

Son muy poco frecuentes. Aparecen a distancia del sitio de la administración. Suelen iniciarse pocos minutos después de la administración, pero hay casos en los que aparecen posteriormente. Los síntomas de estas reacciones son variables en su intensidad, pero lo más importante es reconocerlos rápidamente para tomar las medidas oportunas y evitar complicaciones.

Diater Sublingual Spray Maxi

El paciente puede notar:


Picor cutáneo generalizado. Es muy típica la presencia de picor en palmas y plantas y del cuero cabelludo.

Lesiones cutáneas en forma de enrojecimiento, urticaria o síntomas respiratorios (rinitis o asma).

Otras molestias como, por ejemplo, vómitos y/o diarrea acompañados de otros síntomas sistémicos, malestar general, mareo, estos síntomas pueden sugerir la evolución hacia una situación de mayor intensidad. Se sugiere suspender la inmunoterapia y consultar con su médico. (ver esquema C).

ESQUEMA C

actuación si se presenta una reacción sistémica:



Controles médicos

Sugerimos que asista regularmente a los controles con su alergólogo, según se lo indique.

Estos tratamientos son muy eficaces en la medida que se cumplan con regularidad las pautas de tratamiento, y con los ajustes a la misma que su médico puede hacer según su cuadro clínico. También debe considerarse que la inmunoterapia para lograr el objetivo considera tiempos entre 3 y 5 años de tratamiento.

Esquema de tratamiento

Existen dos esquemas, el Convencional, y la Pauta Rush. Su médico tratante será quién le indique la pauta a seguir. El kit de Diater Sublingual Spray que usted recibió ya viene listo para la pauta que se le recetó. Esto lo sabrá mirando la caja que indica la pauta y porque el Kit Rush sólo trae frascos C (rojos) y el Convencional frascos rojos y un frasco amarillo.

Recomendamos marque en un calendario, su agenda o la agenda del teléfono, los días de aplicación, así tendrá un registro para compartir con su médico, además de hacerse el hábito de la administración de sus dosis diarias.

Use el magnético para refrigerador que viene con su Kit, y manténgalo a la vista. Le ayudará a recordar la aplicación y la fecha de solicitud de renovación.

Tratamiento de iniciación

Vial	Intervalo de administración	Dosis
C Etiqueta Amarilla	1º Día	1 Pulsación/Día
	2º Día	2 Pulsaciones/Día
	3º Día	3 Pulsaciones/Día
	4º Día	4 Pulsaciones/Día

Vial	Intervalo de administración	Dosis
D Etiqueta Roja	5º Día	1 Pulsación/Día
	Diario hasta agotar el contenido del vial	

Tratamiento de Continuación

Vial	Intervalo de administración	Dosis
D Etiqueta Roja	Diario hasta agotar el contenido del vial	1 Pulsación/Día

Pauta Rush

Vial	Intervalo de administración	Dosis
D Etiqueta Roja	Diario hasta agotar el contenido del vial	1 Pulsación/Día

